ООО «Исеть-Ортомед»
620100, г. Екатеринбург, ул. Камнерезов, д. 30
Лицензия № Л041-01021-66/00418827
+7 343 000 62 71
iset-ortomed.example

Центр суставной хирургии «Исеть-Ортомед»

Выписной эпикриз № 1184/24

Пациент: Лаптева Галина Петровна, 03.11.1958 г. р. (65 лет)
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Гранильщиков, д. 18, кв. 52
Отделение: травматолого-ортопедическое № 2, палата 7
Госпитализация: с 11.03.2024 по 19.03.2024, плановая, по талону на оказание ВМП
Лечащий врач: Некрасов А. В.

Диагноз заключительный клинический

Основной: правосторонний гонартроз III стадии. Варусная деформация правого коленного сустава. Выраженный болевой синдром, НФС II.

Сопутствующий: гипертоническая болезнь II стадии, контролируемая артериальная гипертензия, риск 3. Левосторонний гонартроз II стадии. Аутоиммунный тиреоидит, медикаментозный эутиреоз.

Аллергологический анамнез

Новокаин (прокаин): отёк Квинке в 1994 г. при лечении у стоматолога. Других лекарственных реакций не отмечает.

При поступлении

Боли в правом коленном суставе около 8 лет, ходит с тростью. В очереди на операцию с января 2023 г.

Рост, вес	162 см, 81 кг
Группа крови	A (II), Rh (+) положительный
АД, ЧСС	140/85 мм рт. ст., 68 уд./мин
Постоянно принимает	лозартан 50 мг утром, бисопролол 5 мг утром, L-тироксин 75 мкг утром

Рекомендации

1. Ходьба на костылях с дозированной нагрузкой на правую ногу 6 недель, затем с тростью.
2. Лечебная гимнастика 3 раза в день по выданному комплексу, занятия с инструктором ЛФК.
3. Ривароксабан (Ксарелто) 10 мг 1 раз в день вечером до 12.04.2024.
4. Компрессионный трикотаж 2-го класса на обе ноги 6 недель.
5. Перевязки через день. Снятие швов 26.03.2024 в поликлинике по месту жительства.
6. При болях: парацетамол 500 мг до 4 раз в сутки. Новокаин не применять.
7. Контрольная рентгенография и осмотр оперировавшего хирурга через 3 месяца. Запись по тел. +7 343 000 62 71.
8. Перед МРТ и перед лечением у стоматолога и уролога сообщать врачу об эндопротезе. Сведения об импланте — на стр. 2 настоящего эпикриза. Паспорт импланта выдан пациентке на руки.
9. Наблюдение терапевта и кардиолога по месту жительства, контроль АД. Постоянную терапию продолжать.
10. Вопрос об эндопротезировании левого коленного сустава — не ранее чем через 6–8 месяцев.

Листок нетрудоспособности не требуется.

Лечащий врач *Некрасов* Некрасов А. В.

Заведующий отделением *Журавлёв* Журавлёв И. П.

19.03.2024 М. П. ДЛЯ СПРАВОК